

AGA 治療薬(デュタステリド)説明書



内科・脳神経内科
さわらクリニック

AGA(男性型脱毛症)では、ヘアサイクル(毛髪が生え変わるまでの期間)が早くなり、毛根が寿命を迎えてしまう約40回のヘアサイクルを終えるのが早くなってしまいます。寿命を迎えた毛根からは新たに発毛することはありません。AGA 治療薬は、ヘアサイクルを延ばすことで毛根の寿命を延ばし、AGA の進行を抑制することが知られています。以下の特徴をよく理解いただき、同意を得た上で治療を行います。

<特徴>

- ✓ この薬は、AGA を進行させる DHT(ジヒドロテストステロン)というホルモンを増やす 5α リダクターゼの働きを抑え、AGA の進行を抑制します。
- ✓ 同じ AGA 治療薬のフィナステリドは 5α リダクターゼの II 型にしか作用しませんが、デュタステリドは I 型・II 型の両方に作用し強い効果を発揮します。
- ✓ また、II 型の 5α リダクターゼの阻害効果もデュタステリドのほうがフィナステリドよりも強いいため、AGA の進行を抑制する効果は約 1.6 倍とされています。

<方法>


- ✓ 1 日 1 回、1 カプセルを内服していただきます。タイミングはいつでも構いません。
- ✓ ご希望の方には、治療開始前や、治療開始後の定期的な血液検査を行います(検査は自費になります)。検査では肝臓の機能や PSA の値などを確認します。内服開始直後は 3 ヶ月後に、以降は半年毎に検査を行います。

<副作用>

- ✓ 性欲低下や勃起不全(ED)、肝機能障害を起こすことがあります。
- ✓ 副作用の症状が強い場合は薬の減量や中断が必要なことがありますので、医師にご相談下さい。

<その他>

- ✓ 内服中は献血ができず、内服開始中止後も 6 ヶ月以上経過しないと献血はできません。
- ✓ 血液検査で肝臓の機能低下などの異常がある方、20 歳未満の方は治療を受けられません。
- ✓ 服用中は PSA の値が低下するため、前立腺癌の発生を見落としてしまう可能性があります。
- ✓ デュタステリドを 6 ヶ月服用すると PSA の値が約 50%低下するため、測定値を 2 倍した値を基準値と比較する必要があります。
- ✓ 医療機関を受診する際には、デュタステリドを内服していることを必ずお伝え下さい。
- ✓ 治療を受けられた方全員に必ず効果があるわけではありません。
- ✓ 6 ヶ月治療を行っても効果がない場合は中止をご検討下さい。
- ✓ 内服を忘れた場合は、次回服用まで 12 時間以上あいていればその時点で内服して下さい。



全て読み終わり、治療を受けることに同意される方は、QR コードもしくは URL から問診票の入力をお願いします。
入力が完了した時点で予約が完了となります。

<https://x.gd/Hb62B>